

CULEBRERA EUROPEA

(*Circaetus gallicus*)



IDENTIFICACIÓN

Rapaz de considerable tamaño, de 162-185 cm de envergadura y 63-69 cm de pico a cola. Cabeza proporcionalmente grande, redondeada, con ojos amarillos grandes en posición frontal, lo que recuerda a las rapaces nocturnas. Plumaje marrón grisáceo en el dorso, cabeza y cuello hasta el pecho y blanco en las partes inferiores, con estrías o moteado marrón y con tres franjas oscuras en la cola. Hay individuos más claros y más oscuros. El diseño del moteado inferior es variable, incluso hay individuos del todo blancos en la cara inferior, sin estrías y sin “babero” marrón. Alas anchas y largas. Pico curvo, típico de rapaz. Patas largas con tarsos no cubiertos de plumas, de aspecto escamoso, como adaptación a la captura de reptiles. El canto en época de celo es lastimero, un agudo “piuuu....piuuu....” como un maullido. Esta especie se conoce también como águila culebrera, aunque no tenga los tarsos emplumados como las auténticas águilas.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Falconiformes	Accipítridos	<i>Circaetus</i>	<i>C. gallicus</i>



Culebrera posada en un área de matorral abierto

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

En el municipio se encuentra en medios forestales y agroforestales: zonas de pinar, matorral y cultivos de secano. Esta rapaz es poco conocida y no es rara de ver en Caudete. Se distribuye por la Sierra Oliva, principalmente al oeste, y Sierra Lácer. Puede aparecer también, durante sus vuelos de prospección, en otros puntos con superficie forestal abierta, cultivos, zonas alomadas con poca vegetación, etc. En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), ésta fue una de las especies de interés en la zona de Sierra Lácer y La Toconera, aunque también se citaba en otros parajes no seleccionados como zonas de importancia por su todavía bajo muestreo: Cerro Carriles y Entorno de la rambla de Randero (Las Lomas). Se añadió posteriormente la Sierra Oliva como zona de importancia para la especie (Cremades 2008). La población reproductora en el término se ha estimado en 1-2 parejas, en base a las observaciones realizadas en época reproductora (Cremades 2004, Cremades 2008). En el término se han observado parejas reproductoras, individuos prospectando el terreno en busca de presas y ejemplares en migración.



BIOLOGÍA

Especie migratoria estival, reproductora en el término, observable entre marzo y septiembre. Cría en árboles, sobre un nido de ramas. La puesta es de un solo huevo. El pollo permanece más de dos meses en el nido antes de volar. Generalmente planea a baja o media altura o se posa en un elemento elevado a la espera de una presa. También es capaz de cernirse como los cernícalos. Las presas de la culebrera son básicamente reptiles, en particular ofidios, que traga enteros, siendo una auténtica especialista en la captura de éstos.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "vulnerable" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).