

CHOVA PIQUIRROJA (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)



IDENTIFICACIÓN

Ave de mediano tamaño, poco mayor que una paloma (unos 38-40 cm de longitud pico-cola y 75-80 cm de envergadura alar) de plumaje completamente negro, con reflejos metálicos. Pico alargado, fino y curvado, rojo en adultos y anaranjado en jóvenes. Patas rojas. En vuelo llama la atención la separación entre las plumas primarias externas. Su canto característico, un agudo “kíaaaa...kiaaaa...” resuena en los cortados rocosos donde cría, siendo una de las especies rupícolas que llenan de vida estos lugares con sus numerosas bandadas emitiendo los característicos “chasquidos”. También se conoce popularmente como “graja”.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Córvidos	<i>Pyrrhocorax</i>	<i>P. pyrrhocorax</i>



Bando de chovas piquirrojas

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

El hábitat de cría en el municipio lo constituyen los cortados rocosos de las sierras, pero también se encuentra en algunas casas de campo en ruinas. Se alimenta en áreas abiertas con cultivos. Este córvido es abundante en Caudete, de frecuente observación en la zona de montaña y áreas abiertas pastoreadas. Se distribuye mayoritariamente por la Sierra Oliva, donde se encuentra la principal colonia (decenas de parejas crían en la sierra), a pesar de que se citó anteriormente como ave rara (García-Bañón et al. 1983). Aparece también en la mayoría de parajes serranos y agrícolas del término: el Cinchado, Sierra Lácerca, entorno de la sierra del Cuchillo, áreas esteparias del oeste (Casa Alarcón, Los Cuadrones) y noreste (La Mora, El Derramador), ... En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), esta fue una de las especies de interés que aparece en todas estas zonas. La población reproductora en el término se ha estimado en unas 25 a 41 parejas y se considera que la tendencia de esta población es estable (Cremades 2004, Cremades 2008).



BIOLOGÍA

Ave social, sedentaria y reproductora en el término, observable todo el año. Cría en huecos, agujeros o grietas de los cortados rocosos o del interior de las paredes de las casas abandonadas, donde hace el nido. Puede compartir el cortado de cría con otras especies, como el cernícalo vulgar. Acondiciona el nido en marzo. Durante la incubación la hembra, alimentada por el macho, chilla y hace movimientos vibratorios de las alas, pidiendo la comida como si fuera un pollo. Generalmente comienza a incubar a principios de abril, de modo que desde finales de ese mes y durante mayo la pareja alimenta a los pollos en el nido, prolongándose hasta junio la independencia de los jóvenes. En vuelo puede acosar e intimidar a otras aves mucho mayores, como el cuervo y el águila real. A su vez, puede ser acosada por otras menores, como el gorrión chillón. Realiza acrobacias en el aire, con ascensos y descensos flexionando las alas hacia atrás. Desde que acaba la reproducción y hasta la siguiente temporada se alimenta formando grandes grupos (los más numerosos se han contado en otoño, con más de 200 individuos). Sus presas son básicamente insectos terrestres. A veces los bandos se alimentan junto a grajillas o cornejas.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "de interés especial" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).