

PINZÓN VULGAR

(*Fringilla coelebs*)



IDENTIFICACIÓN

Pájaro de 15 cm de longitud, de pico fuerte y cónico, propio de los pájaros granívoros. El macho es muy llamativo: tiene la cabeza y nuca de color gris azulado pero con cara rojiza, pecho rosado y dorso castaño. La hembra y los jóvenes son pardo grisáceos. En todos los casos las alas son negras con dos anchas franjas blancas, perceptibles en vuelo, y la cola tiene los bordes blancos. El obispillo es verde oliva.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Fringílidos	<i>Fringilla</i>	<i>F. coelebs</i>



Pinzón vulgar alimentándose en un camino forestal

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Aunque sea en el bosque donde más se le puede observar, en el término de Caudete esta especie también se encuentra muy a menudo en el medio agrícola, principalmente arbolado: olivares, almendros, nogales y mosaicos de cultivos. También en arbolillos y árboles aislados, alineados o en pequeños grupos, como olmos, pinos y cipreses, que limitan parcelas o aportan heterogeneidad en dichos medios agrícolas. Muy poco en zonas arbustivas. Aunque es una de las aves más comunes en la Península Ibérica y resto de Europa, en Caudete no es de las más frecuentemente observadas, aunque tiene una amplia distribución. En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácerca, donde se diferenciaron 3 zonas (montaña, bosque-matorral y cultivos), esta especie se localizó principalmente en la zona de bosque y matorral, en concreto en el hábitat de pinar (86% de las observaciones), y con un porcentaje de detección del 13%, detectándose a lo largo de todo el año (Cremades 2001).



BIOLOGÍA

Ave residente, observable todo el año, sedentaria o con movimientos estacionales y con llegada de individuos norteños en invierno. Hace dos puestas al año de 4-5 huevos en un nido en árbol o arbusto. El nido está hecho de fino material vegetal y recubierto de líquenes y musgo, por dentro tapizado de plumas y pelos. Aunque es principalmente granívoro, en época de cría se alimenta de insectos y otros invertebrados. Come generalmente en el suelo. En Caudete se han observado tanto individuos solitarios como grupos de tamaño variable, llegándose a contar 150 individuos en un solo grupo, así como grupos mixtos con gorriones molineros.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie catalogada “de interés especial” en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).