

FAUNA SILVESTRE DE CAUDETE

Fotografías y texto de Manuel Cremades García

FICHA 9

TOTOVÍA (*Lullula arborea*)



IDENTIFICACIÓN

Pequeño pájaro (15 cm de longitud pico-cola) de coloración poco llamativa, al igual que la del resto de especies de la familia aláudidos. Se distingue por las dos listas blanquecinas a modo de cejas que, partiendo tras el pico y pasando sobre los ojos, se unen en la nuca, y por la pequeña marca negra y blanca en el borde de cada ala, cerca de donde éstas doblan. Cola corta. Su canto más reconocible es una secuencia descendente de dos sílabas repetidas (Li-u-li-u-li-u-li-u-li-u...), con aire melancólico. En Caudete y otras muchas zonas se da el nombre de totovía a las cogujadas (*Galerida cristata* y *Galerida theklae*), algo mayores que esta especie y con una cresta de la que carece la auténtica totovía.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Aláudidos	<i>Lullula</i>	<i>L. arborea</i>



Totavía incubando

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

El hábitat en el municipio en época reproductora lo constituyen los pinares, mientras en otoño e invierno se reúne en grupos alimentándose en áreas despejadas y cultivos, tanto de secano como de regadío. No es abundante en Caudete, siendo poco frecuente observarla y escucharla. Se ha localizado en áreas agrícolas y en los pinares de La Toconera y de la umbría de la Sierra Oliva-El Revolcador. Posiblemente se encuentra en más áreas en las que no se la ha identificado, pues está citada en la Sierra Oliva como abundante en todas las estaciones (Bañón et al, 1983). En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácera, donde se diferenciaron 3 zonas (montaña, bosque-matorral y cultivos), esta especie se localizó principalmente en la zona de bosque y matorral, en concreto en el hábitat de pinar (80% de las observaciones), y con un porcentaje de detección del 8%, detectándose más en otoño-invierno que en primavera-verano (Cremades 2001). En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), ésta fue una de las especies de interés en la zona de Sierra Oliva y en la de Sierra Lácera y La Toconera.



BIOLOGÍA

Ave residente, poco gregaria en época de cría. Hace un nido en el suelo de zonas forestales, resultando muy difícil de localizar por su mimetismo. Incuba la puesta durante 13-15 días y los pollos permanecen en el nido otros tantos días. Una vez terminada la reproducción forma grupos (observación de un grupo de 40 individuos). Se alimenta de insectos y semillas.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "de interés especial" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).