

BÚHO REAL

(*Bubo bubo*)



IDENTIFICACIÓN

La mayor rapaz nocturna de Europa, con 60-73 cm de pico a cola, 150-180 cm de envergadura alar y 2-3,2 kg de peso. Inconfundible por su gran tamaño, su cabeza grande y redondeada, sus grandes ojos anaranjados en posición frontal y sus características “orejas”. La hembra es mayor que el macho. Plumaje dorsal pardo con manchas oscuras, y ventral pardo amarillento estriado de negro, con mancha blanca en la garganta. En vuelo, alas anchas y redondeadas y cola corta. Vuelo insonoro gracias a las plumas desflecadas. Patas cortas emplumadas, con garras grandes. Pico curvo y fuerte. El canto más conocido es su característico “bu-hu”, profundo, más agudo en la hembra, audible incluso a kilómetros en noches silenciosas sin viento (en la sierra Láceras se ha escuchado a 2 km). Otro sonido es como una risotada corta “ha-ha-ha-ha” decreciente. Esta especie se conoce también como “gran duque”.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Estrigiformes	Estrígidos	<i>Bubo</i>	<i>B. bubo</i>



Búho real en lo alto de un pino carrasco

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Esta rapaz no es rara en Caudete, siendo más fácil escuchar su canto que observar algún individuo. En el municipio se encuentra en zonas rocosas de las sierras. Puede aparecer también en otros puntos durante sus vuelos de prospección y en sus acechos, especialmente en bordes entre superficie forestal y cultivos. En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), ésta fue una de las especies de interés en la zona de Sierra Oliva y en la de Sierra Lácerca y La Toconera. Se añadió posteriormente la Sierra del Cuchillo como zona de importancia para la especie (Cremades 2008). La población en el término, en base a las observaciones realizadas en época reproductora, es de 5 parejas (o territorios ocupados), dos de ellas en Sierra Oliva, otras dos en La Lácerca y otra en el Cuchillo (Cremades 2004, Cremades 2008). La densidad en el área de estudio es de 1 par / 44 - 35,2 km² (Cremades 2008).



BIOLOGÍA

Especie sedentaria, reproductora en el término. Actividad principalmente crepuscular y nocturna. Su canto se escucha casi todos los meses del año, pero principalmente en los más fríos. A finales de diciembre y principios de enero, en pleno celo, el canto de los búhos caudetanos se inicia entre las 17:55 y las 18:19 (hora oficial de invierno) con un canto cada 6,4-8,1 segundos (datos personales anotados de ejemplares de Caudete). No construye nido, haciendo la puesta (2-4 huevos) directamente en el suelo de cuevas, oquedades, cornisas o grietas. Los pollos deambulan por el entorno antes de poder volar. La dieta se compone básicamente de conejos, pero puede atrapar otros mamíferos medianos o pequeños y aves, incluso otras rapaces. Generalmente se posa en un elemento elevado a la espera de sus presas, pero también puede volar a baja altura para buscarlas. Los componentes no digeribles (pelo, huesos, plumas, ...) los expulsa por la boca en forma de egagrópilas.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "vulnerable" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).