

GORRIÓN COMÚN

(*Passer domesticus*)



IDENTIFICACIÓN

Es el ave urbana y rural más conocida y familiar por su proximidad al ser humano. 14-15 cm del pico a la cola. Plumaje que combina el marrón y el gris. Dimorfismo sexual: macho con píleo (boina) gris rodeado de marrón, “corbata” negra, dorso marrón, mejillas y partes inferiores blanquecinas; hembras de tono pardo claro más o menos uniforme, con lista ocular clara. En ambos sexos, dorso estriado de negro y pequeña línea alar blanca. Pico cónico y fuerte. En el suelo se desplaza a saltos. Popularmente también es llamado “tejaíno”.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Paséridos	<i>Passer</i>	<i>P. domesticus</i>



Hembra de gorrión común cebando a dos pollos

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Antropófilo, ocupa núcleos habitados y medios intervenidos por el hombre. En el término de Caudete se encuentra principalmente en el núcleo urbano, por cualquier parte de la población y su periferia, casas de campo y otras construcciones. También en arbolado cercano y otra vegetación asociada a dichas construcciones (setos, jardines, pequeños pinares, huertos), granjas, cultivos, etc. No presente en zonas serranas forestales ni otras áreas naturales, excepto en viviendas de los alrededores de éstas, donde puede instalarse. Abundante, frecuente y fácil de ver.



BIOLOGÍA

Ave sedentaria nidificante en Caudete, adaptada a vivir cerca del hombre. Gregario y social incluso en época de cría (observados grupos de más de 50 aves en abril y mayo). Cría en cualquier grieta o agujero de edificios, bajo tejas, en tuberías, rejas, zonas de ventilación, aparatos de aire acondicionado, ventanas, etc. Generalmente pone 4-5 huevos en un nido poco trabajado, desordenado, consistente en un amontonamiento de hierba, paja, plumas y otros materiales, como papeles. La incubación y la permanencia de los pollos en el nido suponen un periodo de unas 4 semanas. Puede criar varias veces al año. Se han observado cópulas en junio, cuando a esa altura del año ya hay pollos fuera del nido. Es frecuente, en época de cría, ver pollos sin emplumar estrellados contra el suelo al caer del nido. También en esas fechas se observan hembras cebando en el suelo a los pollos emplumados. Come semillas, brotes, frutos, restos de comida, etc. e insectos en verano, con los que ceban a los pollos.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie no protegida (no recogida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha).