

FAUNA SILVESTRE DE CAUDETE

Fotografías y texto de Manuel Cremades García

FICHA 24

ÁGUILA REAL (*Aquila chrysaetos*)



IDENTIFICACIÓN

Gran rapaz diurna, la mayor de las águilas ibéricas, con 80-88 cm de pico a cola, 190-220 cm de envergadura y 3-6 kg de peso. La hembra es mayor que el macho. Plumaje marrón oscuro, en adultas con tono dorado en la parte posterior de cabeza y cuello (de ahí también su nombre de águila dorada). Las jóvenes carecen de dicha tonalidad dorada y el plumaje general es marrón muy oscuro, casi negro, y presentan superficies blancas bajo las alas y en la base de la cola, que se irán perdiendo con la edad. En vuelo, las largas alas forman una "V" muy abierta y en sus extremos las plumas aparecen abiertas a modo de dedos. Cola larga. Patas emplumadas hasta la base de los dedos, con garras muy grandes. Pico curvo, grande y fuerte.

ENCUADRE TAXONÓMICO


| Clase | Orden | Familia | Género | Especie |
|-------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
| Aves | Falconiformes | Accipítridos | <i>Aquila</i> | <i>A. chrysaetos</i> |



Pareja de águilas reales en vuelo

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Propia de medios rocosos. En el municipio no es raro observarla en cualquiera de las tres sierras (Oliva, Lácer y Cuchillo), aunque es más frecuente en la Sierra Oliva, donde se reproduce con regularidad. Está citada como especie ocasional en la Sierra Lácer (Cremades 2001), donde no se descarta que intentara criar (en 2010 se observó un individuo con una rama en las garras). En la identificación de zonas de importancia para la fauna en el término municipal (Cremades 2004), ésta fue una de las especies de interés en la zona de Sierra Oliva, en la de Sierra del Cuchillo, Casa Alarcón y Los Cuadrones y en la de Sierra Lácer y La Toconera. La población en el término, en base a las observaciones realizadas en época reproductora, es de una pareja en Sierra Oliva (Cremades 2004, Cremades 2008), aunque también se observan parejas o individuos solitarios en vuelo por las otras sierras.



BIOLOGÍA

Especie sedentaria, reproductora en el término. Cuando vuela es frecuentemente acosada por aves menores que ella (cernícalos, chovas, cuervos). Planea a baja altura prospectando el terreno en busca de presas (conejos, otros mamíferos, aves medianas, reptiles) para sorprenderlas. Realiza la puesta en una enorme plataforma de ramas en cortados rocosos. En Sierra Oliva se han localizado ocho plataformas (lo que indica la antigüedad de la presencia de la especie en la sierra), habiendo sido utilizadas al menos cuatro durante el periodo 2002-2016. Incuba durante mes y medio, relevándose macho y hembra. Los pollos, generalmente dos, al final de su desarrollo vuelan a repisas próximas fuera del nido para ejercitar las alas, esperando allí las presas que traen los padres. Pueden volar a finales de junio o principios de julio. En 2002 y 2003 se constató la presencia de un pollo, al igual que en 2005 (González, com. pers.) y 2009 (Cañizares, com. pers.), mientras que en 2012 y 2014 a 2016 la producción fue de dos pollos.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie recogida en la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva "Aves") en su Anexo I (especies objeto de medidas especiales en cuanto a su hábitat). Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "vulnerable" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).