

## GOLONDRINA COMÚN

(*Hirundo rustica*)



### IDENTIFICACIÓN

Ave de pequeño tamaño (18-20 cm de longitud del pico a la cola), familiar por estar ligada a la presencia humana. Plumaje dorsal negro azulado con reflejos; garganta y frente castaño rojizo y partes inferiores blancas. Franja oscura bajo la garganta. Pico pequeño y boca grande. Alas puntiagudas, largas, menos curvas y más cortas que las del vencejo, plegadas no rebasan el extremo de la cola. Cola larga y muy ahorquillada, debido a las dos largas plumas rectrices externas, sobre todo en machos. Los jóvenes tienen mucho más cortas estas plumas. Patas pequeñas.

### ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Hirundínidos	<i>Hirundo</i>	<i>H. rustica</i>



Pareja de golondrinas comunes

## HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Muy frecuente en el medio rural y menos en el urbano. El hábitat de cría en nuestro municipio lo constituye principalmente el núcleo urbano y el medio agrario, donde ubica los nidos en edificios y casas de campo, tanto abandonadas como en uso. Distribuida por buena parte del término y representada con cierta abundancia, se puede ver en vuelo, en pasadas rasantes para coger agua (en balsas de riego, piscinas, ...) o posada en cables o en bordes de charcos recogiendo barro. Se alimenta en áreas abiertas: campos de cultivos herbáceos en secano o en regadío, cultivos leñosos (olivar, viñedo), zonas llanas con vegetación silvestre (pinar, espartizal) o en lo alto de sierras. En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácerca, esta especie tuvo un porcentaje de detección del 24% en época estival (Cremades 2001).



## BIOLOGÍA

Ave estival nidificante, observable de marzo a septiembre. Construye un nido en forma de cuenco, hecho de barro mezclado con paja o hierbas y totalmente abierto por arriba, en los vértices superiores de habitaciones de casas rurales, casi pegado al techo, o en el exterior, en cornisas o aleros de construcciones. Para construirlo recoge barro junto a charcos y va depositando pequeñas pelotitas. Puede realizar dos o más puestas al año, generalmente de 4-5 huevos. Tras salir del nido y durante un tiempo, los jóvenes se posan en un cable o rama, alineados, para que los alimenten los adultos. Normalmente vuela a menor altura que aviones y vencejos. Se alimenta en vuelo de insectos voladores. Se concentra en grandes bandadas antes de migrar a África tropical.

## PROTECCIÓN LEGAL

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada "de interés especial" en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).