

## PARDILLO COMÚN

(*Carduelis cannabina*)



### IDENTIFICACIÓN

Pájaro de 13-14 cm de longitud, con pico cónico corto, al igual que otras especies de su familia, y cola ahorquillada. El macho en época reproductora es muy llamativo: tiene la cabeza gris, con una mancha rojo carmín en la frente y amplia superficie del mismo color en el pecho. Dorso castaño claro o canela y pecho de fondo cremoso con estrías verticales. Hembras y jóvenes son pardo grisáceos, con estrías longitudinales en el pecho y sobre la cabeza, más listados los jóvenes. Ambos sexos presentan marca pálida en la mejilla, garganta blanquinosa con listas oscuras y bordes blancos en plumas primarias de alas y en la cola.

### ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Fringílidos	<i>Carduelis</i>	<i>C. cannabina</i>



Pardillo común (dcha.) junto a triguero, especie con la que se asocia en bandos mixtos

## HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

En el término de Caudete se encuentra tanto en el medio forestal como en el agrícola y, en este último, tanto en áreas de regadío como de secano. La formación agrícola donde más registros de esta especie se han recogido es la de almendros, pero también se encuentra en olivares, viñas, frutales, herbáceas y combinaciones de las anteriores. En cuanto a los medios forestales, prefiere las formaciones arbustivas abiertas de coscoja, enebro y espinos negros, entre otras especies, y menos frecuentemente el pinar. Es común verlo posado en vallados o cables. En Caudete no es de las aves más frecuentemente observadas, aunque tiene una amplia distribución. En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácera, esta especie se menciona como ocasional en los cultivos de la periferia del paraje (Cremades 2001).



## BIOLOGÍA

Ave residente, observable todo el año, con movimientos estacionales y con llegada de individuos norteros en invierno. Pone 4-6 huevos en un nido situado en un arbusto. Granívoro, se alimenta de semillas de plantas herbáceas silvestres y a veces algunos insectos en época de cría. Muy gregario, en Caudete se han observado tanto parejas (en primavera) como grupos de tamaño variable (en invierno), llegando a contar 200 individuos en un solo grupo, así como grupos mixtos con jilgueros o con trigueros, buscando alimento por los campos.

## PROTECCIÓN LEGAL

Especie no protegida (no recogida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial ni en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha).