

CUERVO

(*Corvus corax*)



IDENTIFICACIÓN

El mayor de los paseriformes, del tamaño de una rapaz de tamaño mediano (unos 63 cm de longitud pico-cola y 120 cm de envergadura alar), de plumaje completamente negro, con reflejos metálicos. Pico negro, grande y robusto. Patas negras. En vuelo, silueta en forma de cruz, con alas apuntadas y cola larga en forma de cuña. Los jóvenes son algo pardos y sin brillo. Su voz habitual es un graznido profundo, grave y resonante, “kgrook-krrrook”. Presenta variaciones y otros sonidos, especialmente en época nupcial. Se distingue de la corneja negra (*Corvus corone*), con la que se puede confundir, por su mayor tamaño, el pico más grueso, la cola en cuña (borde recto en la cola de la corneja) y el graznido (no profundo y más agudo en la corneja).

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Córvidos	<i>Corvus</i>	<i>C. corax</i>



Cuervo en vuelo

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

El hábitat de cría en el municipio lo constituyen los cortados rocosos de las sierras. Se alimenta en áreas abiertas con cultivos. En el término se han registrado aves alimentándose en viñedos, tanto tradicionales como en espaldera, almendros, tierras labradas y eriales. No es muy común en Caudete. Se encuentra principalmente en la Sierra Oliva, donde cría una pareja. Aparece también en la Sierra Lácera, donde posiblemente haya criado (se observó una pareja en 2009 pero sin localizarse el nido), por lo que se cree que la población reproductora en el término, en base a las observaciones realizadas, es de una pareja, pudiendo haber años en que hayan criado dos. En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácera, donde se diferenciaron 3 zonas (montaña, bosque-matorral y cultivos), esta especie se localizó por igual en la zona de bosque y en la de montaña (50% de las observaciones en cada zona), y con un porcentaje de detección del 8%, detectándose a lo largo de todo el año (Cremades 2001).



BIOLOGÍA

Ave sedentaria y reproductora en el término. Cría en oquedades o grietas de los cortados rocosos, donde hace el nido, grande y formado por palos de cierto tamaño. Parejas unidas de por vida. Vuelos nupciales muy llamativos por sus piruetas arriba y abajo, volteos y picados. Acosa en vuelo al águila real y con frecuencia es acosado por chovas piquirrojas, con las que comparte lugar de reproducción. Generalmente se ven parejas, aves solitarias o grupos familiares de 3 a 6 individuos. Además, aparecen individuos en bandos que forman dormideros al finalizar el día, a veces muy numerosos (sin embargo en Caudete el más numeroso que se ha contado es de 11 individuos). Omnívoro, se alimenta de carroña, huevos, pequeños animales, semillas y frutos.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie catalogada “de interés especial” en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).