



MIRLO COMÚN

(*Turdus merula*)

IDENTIFICACIÓN

Ave muy conocida de unos 25 cm de longitud pico-cola. Macho de plumaje completamente negro mate, con pico y anillo ocular amarillo anaranjado, mientras la hembra es de plumaje marrón oscuro, con garganta y pecho más claros y con manchas, y pico oscuro o amarillento. Cola larga. Es típica su postura con la cola levantada y las alas caídas, mientras avanza por el suelo a saltos, o con cabeza y cola en línea horizontal, correteando y haciendo paradas. Vuelo recto y potente. Canto melodioso, variado, intenso especialmente por las noches, mucho antes del amanecer. También emite un cacareo o tableteo de alarma al ser descubierto (“chac-chac-chac-chac”), que puede acabar en gritos agudos a la vez que sale volando hacia su escondite en vuelo bajo.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Túrdidos	<i>Turdus</i>	<i>T. merula</i>



Mirlo común buscando alimento entre la hojarasca

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Asociado a ambientes tanto forestales como agrícolas, incluso a zonas urbanas. En Caudete aparece por todo el término municipal, es muy abundante y de frecuente detección. En el medio forestal ocupa pinares, vegetación de ramblas, formaciones arbustivas (de enebro, espino negro, esparto, etc.), tanto densas como abiertas; en el agrícola elige olivares, almendros, viñedos, higueras y otros frutales y mosaicos de estos cultivos; y en el medio urbano se ve principalmente en casas a las afueras del pueblo, siempre que haya arbolado o setos. También en puntos con agua. En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácer, donde se diferenciaron 3 zonas (montaña, bosque-matorral y cultivos), esta especie fue una de las más abundantes y se localizó principalmente en la zona de bosque y matorral, en concreto en el hábitat de pinar (93% de las observaciones), y con un porcentaje de detección del 45%, detectándose a lo largo de todo el año (Cremades 2001).



BIOLOGÍA

Sedentario, aunque en invierno pueden llegar individuos del norte de Europa. Se mueve principalmente en el suelo. Nido en forma de taza, generalmente en una horquilla de árbol o arbusto, hecho con material vegetal y barro, en el que pone 4-5 huevos. Se alimenta, dependiendo de la época, de frutos, lombrices (las saca hábilmente del suelo, fácil verlo en días lluviosos), caracoles u otros moluscos terrestres, insectos, según lo que abunde, y restos de comida.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie catalogada “de interés especial” en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).